

Prilog 4

Primjer praćenja pacijenta: **J. K. (1996)**

Prije srčanog aresta

Tv: 186 cm, Tt: 77 kg

Amneza: prije 2 god ustanovljen povišen kolesterol ~8 mmol/l, trigliceridi nepoznati

Poslije srčanog aresta (~2 mjeseca)

Tt: ~ 55 kg

14.01.2011: Prijemu bolnicu KB Dubrava

I. MJERENJE, 03.02.2011

-izrazito bljedilo kože

TSF(ruka + leđa)prosijek= 20 mm= 2cm
(TSF= kožni nabor)

OBUJAM NADLAKTICE= 260 mm= 26 cm

CAMA(cm²) = $\{26,0 - (\pi \cdot 2)^2\} / 4\pi - 10 = 20,96 \text{ cm}^2$ **< 5 PERCENTILI, SLABA KATEGORIJA**
(CAMA-ukupna tjelesna mišićna masa)

FAT BODY = 8,32 % **< 10 % POTHRANJEN**
(FAT BODY%- očitano iz tablice prema kožnom naboru (TSF))

FAT ARM = $20 \cdot 260 / 2 - (20)^2 \cdot \pi / 4 = 22,86 \text{ cm}^2$ **75 PERCENTILI**

CACM / VISINA = 20,96 cm²/187 cm **<5 PERCENTILA**

TSF/GODINE = 20 mm/18 god **90 PERCENTILA**

II. MJERENJE, 15.02.2011

-koža normalne boje

TSF = 23 mm = 2,3 cm

OBUJAM = 260 mm = 26 cm

CAMA(cm²) = 18,05 **<5 PERCENTILI**

FAT BODY% = 10

FAT ARM = 25,75 cm²

TSF/GODINE **95 PERCENTILA**

III. MJERENJE, 25.02.2011

- KBD, Tt = 60 kg

IV. MJERENJE, 20.03.2011

- KBD, Tt = 63 kg

V. MJERENJE, ~nakon 4 mjeseca

-Tt = 70 kg